



BEHANDLING AF FNAT med Soolantra® creme (ivermectin)

Da behandlingen med NIX® creme ikke har haft effekt hos dig, anbefales behandlingen foretaget med Soolantra® creme.

Soolantra® indeholder det aktive stof ivermectin 1%, som er det samme stof, der findes i de tabletter der bruges til behandling af fnat.

De europæiske retningslinjer for behandling af fnat anbefaler behandling med ivermectin, hvis Nix® creme ikke har haft effekt.

Producenten af Soolantra® har ikke søgt om godkendelse af produktet til behandling af fnat, hvorfor behandling med Soolantra betragtes som "off-label" behandling, selvom det er en sikker og effektiv behandling.

Behandlingen:

Inden behandlingen foretages der afvaskning af kroppen. Huden skal være helt tør inden cremen smøres på.

Tag alt tøj af. Hele kroppen, fra kæbebenet og bag ørene og nedefter, påsmøres fuldstændigt et tyndt lag creme (få hjælp til at smøre ryggen ind).

I visse tilfælde skal cremen også påføres i ansigtet, men kun efter aftale med lægen.

Fingre, håndled, tæer, brystvorter, armhuler, navle, kønsdele samt området omkring endetarmsåbningen indgnides særligt omhyggeligt. Til sidst indsmøres hænderne en ekstra gang.

Cremen skal sidde på huden i 12 timer. **HUSK** :Hvis hænderne vaskes i løbet af de 12 timer, skal de påføres cremen igen.

Der skal bruges ca. 30 gram (= 1/2 tube) til en voksen person til én fnatkur.

Det er desuden en god ide at klippe neglene helt korte.

Efterbehandling:

Afvaskning af cremen:

Næste morgen (efter 12 timer) afvaskes cremen grundigt med varmt vand og sæbe - helst ved et brusebad. Tag derefter rent tøj på.

Hjemmet skal saneres for fnatmider: Sengetøj og håndklæder skiftes og vaskes ved 60 grader. Tøj, der er anvendt indenfor den sidste uge, skal enten vaskes ved min 60 grader i vaskemaskinen eller lægges i en lukket plastikpose i en uge.

Senge, møbler og gulvtæpper skal støvsuges, hjemmet rengøres med almindelig rengøringsmiddel.

Det anbefales at undgå tæt kropskontakt med andre i 36 timer efter en fnatkur.



Det er ikke ualmindeligt at hudkløen fortsætter i op til 4 uger efter behandlingen selvom alle mider er dræbt af behandlingen. Undgå uldent tøj direkte mod huden i den første tid efter behandlingen (da det i sig selv kan give kløe).

Fnatkur skal gentages efter en uge.

Alle tætte relationer (husstand, kæreste og lignende) skal behandles samtidigt med **NIX® PERMETHRIN CREME** - også selvom der ikke er symptomer hos alle!

Kløen ved fnat skyldes blandt andet allergi overfor midens efterladenskaber i fnat-gangene. Det tager tid før huden er udskiftet og de døde mider og deres efterladenskaber er afstødt samt før den nye hud er vokset frem.

Vedvarende kløe behøver ikke at betyde, at behandlingen ikke har virket.

Dog skal du kontakte klinikken igen efter 4 uger hvis kløen ikke er svundet.